

ENDOMETRIOSIS ÉS MEDDŐSÉG

Dr Szendei György, egyetemi adjunktus, Ph.D.
SE. I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Igazgató: Prof Dr Rigó János Jr.

A meddőség a világ civilizált országaiban a lakosság 15-20%-át érinti. A magyar szülészeti adatok alapján, hazánkban évente 7500-10000 ezer új meddő pár kerül be a gondozottak közé.

Nemzetközi és hazai vizsgálati adatok alapján minden negyedik esetben a meddőség endometriosisra vezethető vissza. Ez első megközelítésben 1850-2000 beteget jelent az egészségügyi ellátó rendszer számára. A megbetegedés csak szövettani vizsgálat alapján állítható fel. A tünetek alapján azonban korán gondolhatnánk endometriosisra is. A tünetek között elsőként említendő a dysmenorrhoea, a sexuális együttlét során fellépő fájdalom- a dyspareunia, továbbá az ezektől függetlenül meglévő krónikus kismencedei fájdalom. A laparoscopia széles körben rutin eljárásként való alkalmazása jelentős előrelépést hozott. Az endometriosis ellátásában az első sebészeti ellátás a peröntő. A gyógyszeres kezelés csak átmenetileg segít a betegen.

Az egészségügyet finanszírozó ellátó rendszert is érdekeltté kéne tenni a meddőségi betegek hatékony ellátásában.