

Rec hCG használatával nyert tapasztalataink IVF-ET ciklusok során

Dr. Zeke József, Dr. Szűcs Zoltán, Dr. Konc János PhD
Szt. János Kórház, Budai Meddőségi Centrum, Budapest

Előretöltött fecskendőben forgalmazott rec hCG 2001-től elérhető az EU-ban, a 2004-es csatlakozást követően pedig hazánkban is. Intézetünkben ettől kezdve alkalmazzuk a gyógyszeres szuperovulációs kezelések végén ovuláció indukció céljából. Gyakorlatunkban a recombináns hCG használata még nem szorította ki az urinalis hCG-t. Jelen tanulmányunkban két IVF-(ICSI)-ET kezelésben részt vett betegcsoportot homologizáltunk BMI, bFSH, basalis antrális folliculus szám és életkor figyelembevételével annak alapján, hogy a luteinizációt rec vagy u hCG-vel váltottuk ki. A két csoport adatait elemezve taglaljuk az IVF (ICSI) kezelési ciklusok során nyert M II oocyták, a beültetésre alkalmas embriók számát, és a rec illetve u hCG alkalmazása után fellépő OHSS incidenciát. Eredményeink elemzése után közzétesszük tapasztalatainkat arról, hogy milyen tényezők motiválnak bennünket, amikor döntünk az IVF (ICSI) kezelési ciklusaink végén a luteinizációhoz használt hCG mennyiségéről és fajtájáról.